

Définitions de cas autour de Coronavirus COVID-19 10 mars 2020

Cas suspect

- A. Tout patient présentant:
- 1. une infection respiratoire aiguë fébrile quelle que soit la gravité:
 - T°≥38°C (axillaire corrigée de +0,5°C), ET
 - au moins un des signes suivants: toux ou écoulement nasal ou maux de gorge ou difficulté respiratoire

ET

2. un antécédent de séjour dans les pays où la transmission est active dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes (à mettre à jour selon la liste des pays à risque dans le SITREP OMS)

Ou

- B. Tout patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë ET au moins l'un des éléments suivants:
- contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes,

ou

• ayant travaillé ou fréquenté un établissement/centre de soins de santé au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes où des infections à COVID-19 ont été signalées.

Ou

C. Toute personne présentant des signes de détresse respiratoire aigüe pouvant aller jusqu'au Syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) dans un contexte possiblement viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans autre étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage/séjour au viral et sans au viral

dans les pays où la transmission est active ou de contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19.

Cas probable

Un cas suspect pour lequel le test de COVID-19 est douteux ou pour lequel le test était positif sur un essai pan-coronavirus.

Cas confirmé

Une personne avec une confirmation en laboratoire de l'infection au COVID-19, quels que soient les signes et symptômes cliniques.

Contact étroit

Toute personne ayant voyagé dans le même moyen de transport, partagé le même foyer, même bureau, même classe.

DIRECTEUR

OF CAFALLMANANTSDA-SOLOFONIAINA

Armand Médecin Epidémiologiste d'intervention